

*Si tiene alguna
consulta, hable
con su médico
o enfermero.*

Terapia de Furosemida (Lasix®) Intravenosa

Furosemida es un medicamento que se utiliza para tratar los síntomas de la insuficiencia cardiaca. Con la insuficiencia cardiaca, el corazón no puede bombear la sangre tan bien como debiera. Eso hace que el líquido regrese a los pulmones y a algunas partes del cuerpo.

La furosemida es un medicamento diurético (pastilla para eliminar el agua) que ayuda a eliminar el sodio (sal) y agua adicional del cuerpo. Ayuda a los riñones a hacer más orina. Cuando se elimina el líquido adicional, su corazón puede bombear mejor.

Cómo recibir furosemida en la clínica

Durante su consulta clínica, es posible que el médico decida que la terapia de furosemida le ayudará. La furosemida puede darse como píldora por la boca o como una inyección en una vena (IV). Cuando se administra por vía intravenosa, funciona mejor para eliminar el líquido con más rapidez.

El enfermero preparará el medicamento en una jeringa. Luego se le inyectará lentamente en una vena mediante una aguja pequeña.

Sentirá la necesidad de orinar minutos después de que se le administre el medicamento. Es posible que necesite orinar varias veces las próximas horas a medida que el cuerpo elimina el líquido.

Después de recibir el medicamento, le pediremos que permanezca sentado en el área de espera de la clínica hasta que orine y se sienta cómodo de regresar a casa de manera segura.

Efectos secundarios de la furosemida

Este medicamento elimina líquido adicional del cuerpo, así que podría experimentar los siguientes síntomas:

- Mareos
- Aturdimiento
- Debilidad
- Calambres musculares o dolor de piernas

- Boca seca
- Aumento de la sed
- Zumbido en los oídos o pérdida auditiva (Esto rara vez ocurre y hay mayor probabilidad con dosis altas)

Que hacer en casa

Lleve un registro

Es importante llevar un registro escrito en casa para que le ayude a advertir los cambios en su cuerpo o cómo se siente.

- Registre su presión arterial todos los días.
- Registre su peso. Pésele todos los días en los siguientes momentos:
 - Al levantarse
 - Después de usar el baño por primera vez en el día
 - Antes de comer o beber
- Registre cualquier síntomas que tenga.

Limite el sodio y los líquidos

- Limite su consumo de sodio a 2,000 miligramos o menos todos los días.
- Limite su consumo de líquidos a 64 onzas (aprox. 2 litros) al día. Eso incluye alimentos no sólidos como sopas, paletas, gelatina, yogur y helados.

Conozca los síntomas de la insuficiencia cardíaca

Utilice la guía *Zona de Insuficiencia Cardíaca* para ayudarlo a controlar sus síntomas. Llame a la clínica al 312.695.4965 si advierte alguna de las siguientes opciones:

- Aumento de 2 libras o más en 1 día o 5 libras o más en 1 semana
- Inflamación de los pies, piernas o abdomen
- Aumento de la falta de aire
- Nuevo inicio de la tos
- Mareo al pararse o sentarse
- Frecuencia cardíaca acelerada o irregular
- Dolor de pecho que no se alivia

Llame al 911 o vaya directamente al departamento de emergencias más cercano si experimenta:

- Falta de aire intensa y constante
- Desmayo o “desvanecimiento”
- Dolor de pecho que persiste o molestias que no se alivian con nitroglicerina y que dura más de 15 minutos
- Confusión o dificultad para pensar

- Signos de una reacción alérgica a la furosemida como:
 - Hinchazón de la lengua o cara
 - Nuevo sarpullido
 - Sentir como si la garganta se cierra

Para obtener más información

Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas, consultas o desea solicitar materiales adicionales.

Northwestern Medicine Bluhm Cardiovascular Institute

Galter Pavilion

675 North Saint Clair Street, Suite 19-100

Chicago, Illinois 60611

312.695.4965

TTY: 711

Recursos en internet

Obtenga más información sobre la salud cardíaca en los siguientes sitios web:

- Northwestern Medicine Bluhm Cardiovascular Institute
heart.nm.org
- American Heart Association (AHA)
heart.org
- American College of Cardiology
cardiosmart.org

