

*Para su
seguridad,
tome este
medicamento
solo como se
le indique.
Comuníquese
con su equipo
de atención si
tiene preguntas.*

Hidrocodona con Acetaminofén (Lortab®, Lorcet®, Norco®, Vicodin®)

Este medicamento combina 2 tipos distintos de medicamentos para el dolor:

- Acetaminofén
- Hidrocodona

La hidrocodona es un analgésico narcótico. Actúa en el cerebro para aliviar el dolor. El acetaminofén se conoce como Tylenol®. Alivia el dolor y la fiebre. Juntos pueden proporcionar mejor alivio del dolor en algunos tipos de dolores en lugar de tomar solamente 1 de estos medicamentos. Sin embargo, informe a su médico si no se le quita el dolor. Infórmeles si tiene otro tipo de dolor.

Dosificación y administración

Tome este medicamento exactamente según lo recetado. Su médico le informará cuántos comprimidos tomar y cuándo. Si no se toma correctamente, aumenta el riesgo de que sufra efectos secundarios.

Trague los comprimidos enteros con un vaso lleno de agua. Puede tomarlos con alimentos o leche, tomarlos solo con agua provoca molestias estomacales.

Tome este medicamento según lo recetado solo cuando necesite controlar el dolor. Este medicamento tarda aproximadamente 20 minutos en comenzar a funcionar.

Efectos secundarios

Este medicamento puede causar:

- Somnolencia
- Náuseas
- Estreñimiento
- Mareos

Generalmente, esto se produce con la 1ra dosis o si cambia su dosis. Infórmele a su equipo de atención si observa otros efectos secundarios.

Tomar de 6 a 8 vasos de agua al día puede ayudar a evitar el estreñimiento. Hable con su equipo de atención sobre el uso de laxantes o ablandadores de heces si piensa que podría ayudarlo. Llame a su médico si no evacúa durante 3 días.

Interacciones

El alcohol y otros medicamentos pueden afectar la función de este medicamento. Algunos ejemplos de esto, incluyen la warfarina, la cimetidina y los medicamentos para las convulsiones. Pregúntele a su médico o farmacéutico si se afecta con otros medicamentos que esté tomando.

Antes de tomar este medicamento, informe a su médico si:

- Consume alcohol
- Tiene antecedentes de estreñimiento o tiene dificultad para evacuar
- Alguna vez tuvo una enfermedad hepática, como la hepatitis
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria o colitis ulcerosa
- Tiene otros problemas médicos
- Es alérgico a la codeína, hidrocodona o acetaminofén
- Está embarazada o amamantando

Seguridad de los medicamentos

Para su seguridad:

- No conduzca ni realice otras tareas que requieran alerta mental mientras toma este medicamento.
- No consuma alcohol mientras toma este medicamento. Puede aumentar el riesgo de adormecimiento, pérdida de conciencia o muerte.
- No comparta este medicamento con nadie.
- No tome medicamentos para las alergias o el resfriado que puedan darle sueño.
- No tome otros medicamentos que tengan acetaminofén sin consultarlo con su médico.

La hidrocodona puede transformarse en un hábito:

- No tome dosis adicionales.
- No tome más comprimidos de los recetados.
- No tome con más regularidad de lo recetado.
- No tome durante un período más prolongado al recetado.

Tomar este medicamento en exceso puede poner en riesgo la vida. Si cree que usted o alguna otra persona puede haber tomado una sobredosis, llame al 911 o acuda inmediatamente al departamento de emergencias más cercano.

El exceso de acetaminofén puede dañar el hígado.

- No tome otros medicamentos con acetaminofén (como Tylenol) mientras toma este medicamento, a menos que su médico lo autorice. Muchos medicamentos de venta libre (OTC, en inglés), incluso los medicamentos para la tos y el resfriado, contienen acetaminofén. Lea cuidadosamente las etiquetas o consulte a su farmacéutico para entender las cantidades.

- No tome más de 4,000 mg de acetaminofén en 24 horas sin consultarlo con su médico o farmacéutico. Hable con su médico sobre los límites de 24 horas que puedan ser adecuados para usted.
 - Podría tener que limitar el acetaminofén de 2,000 a 3,000 miligramos al día, en dosis divididas, si alguno de los siguientes le aplica:
 - Ayunas/desnutridos
 - Tienen diabetes
 - Están tomando isoniazida
 - Son consumidores frecuentes de alcohol

Es posible que su médico le diga que no tome nada más junto con el acetaminofén.

Almacenamiento y eliminación

Conserve este medicamento de las siguientes maneras:

- En su envase original y bien cerrado
- Fuera del alcance de los niños
- A temperatura ambiente
- Lejos del calor y de la luz directa
- Lejos de lugares húmedos, como el baño

Deseche todos los medicamentos de forma segura. Este medicamento puede ser nocivo para los niños, las mascotas u otros si lo ingieren por accidente. Para garantizar la eliminación segura de los medicamentos sobrantes, lleve los medicamentos a un sitio de recolección.

- Pregunte en su farmacia local si reciben el sobrante del medicamento para eliminarlo.
- Participe en eventos de devolución. Llame al servicio de reciclaje y recolección de residuos del hogar del gobierno de su ciudad o condado. Pregunte si hay un programa de devolución de medicamentos disponible cerca de usted.
- Busque sitios de recolección cerca de usted a través del sitio web de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, inglés): **apps.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1**
- Llame a la DEA al 800.882.9539 para encontrar un sitio de eliminación cerca de usted.

Si no puede encontrar un recolector autorizado, siga los siguientes pasos:

1. Saque el medicamento del envase original.
2. Mézclelo con arena para gatos, basura o posos de café.
3. Coloque la mezcla en una bolsa o un recipiente con cierre hermético.
4. Tírelo en la basura de su casa.
5. Elimine toda la información personal (como su nombre y dirección) del envase original. Tírelo a la basura.

Esta información no describe todos los posibles usos o efectos secundarios del medicamento. Comuníquese con su médico o farmacéutico para obtener más información.

Para obtener información adicional sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web nm.org.

Desarrollado por: Departamento de Farmacia de Northwestern Memorial Hospital

© Mayo de 2023 Northwestern Memorial HealthCare

900380 (5/23) Hydrocodone with Acetaminophen (Lortab®, Lorcet®, Norco®, Vicodin®)