

TRILYTE, GOLYTELY, NULYTELY, o COLYTE

PEG 3350

PREPARACIÓN INTESTINAL

NO SIGA LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN EN LA CAJA DEL PRODUCTO O LAS QUE PROPORCIONA LA FARMACIA. DEBE SEGUIR NUESTRAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN TAL COMO APARECEN EN ESTE DOCUMENTO.

1. La mañana **del día del examen**, agregue agua tibia/a temperatura ambiente hasta la línea "Fill" (lleno) en la jarra, tape y agite vigorosamente hasta disolver el polvo; refrigere.
 2. A partir de las **4 o 6 p. m. del día previo al examen**, beba **8 onzas de la solución cada 10 a 15 minutos** hasta tomar la mitad de la solución.
 3. A partir de **6 horas antes de la hora de llegada**, comience a beber el resto de la solución de la misma forma que la primera mitad: **8 onzas cada 10 a 15 minutos**.
- Es normal que se sienta un poco inflamado. Esto mejorará a medida que comiencen los movimientos intestinales.
 - Deberá beber varios vasos antes de evacuar por primera vez.
 - Si siente demasiadas náuseas, deje de beber durante 20 a 30 minutos y luego retome a un ritmo más lento.
 - Asegúrese de terminar la preparación o el colon puede no quedar adecuadamente limpio.
 - Demorará aproximadamente **1.5 horas** para beber cada mitad de la preparación. La diarrea continuará hasta por una hora después.